

ST2

Para iChroma y AFIAS

El Supresor de Tumorigenicidad 2, conocido como ST2 es un indicador del aumento de riesgo en los pacientes con una insuficiencia cardiaca descompensada en un contexto ambulatorio.



Más información en labindustrias.com

PBX y WhatsApp: (502) 2291-9000
ventas@labindustrias.com

11 avenida 36-71 zona 11, Ofibodegas Centro Once,
Bodegas 5 y 6, Colonia Las Charcas
Guatemala

La elevación simultánea de las concentraciones de NT-proBNP y ST2 por encima de sus correspondientes puntos de corte pronostica un riesgo de mortalidad muy superior al hallado con la elevación aislada de uno de los dos biomarcadores, mejorando notablemente la estratificación de riesgo de dichos pacientes.

El American College of Cardiology y la American Heart Association, presentaron por primera vez en el año 2013 la recomendación de su uso en las Guías para el seguimiento y tratamiento de la insuficiencia cardiaca, tanto aguda como crónica. Actualmente, está recomendada por asociaciones de cardiología de Europa y América Latina.

Esta prueba está disponible en Labindustrias para iChroma y AFIAS, es un inmunoensayo de fluorescencia que emplea suero o plasma y, a diferencia de otras, es la única que también puede utilizar sangre completa para su cuantificación.

Se obtienen resultados en tan solo 12 minutos.



Síguenos en:

